

Articles récents supportant le développement de cliniques PEP

- « En conclusion, la recherche supporte que les investissements dans les Programmes PEP seraient une option « cost-effective » dans les pays où ils ont été mis en place.
Aceituno D., Vera N., Prina AM et al. Cost-effectiveness of early intervention in psychosis : Systematic review.*Br J Psychiatry* 2018.
- Quel que soit l'outil d'évaluation employé, dans la schizophrénie, une DPNT plus longue est associée à un plus mauvais pronostic, à court et à long termes et ce dans plusieurs domaines.
Souaiby L., Gaillard R., Krebs MO. Durée de psychose non traitée : État des lieux et analyse critique. *Encephale* 2016.
- « il est essentiel d'élaborer un programme permettant la détection, le plus tôt possible, des signes et des symptômes psychotiques et visant le plein engagement de la personne à s'impliquer dans son traitement.
Les données probantes appuient l'instauration d'équipes interdisciplinaires pour détecter tôt et traiter rapidement les personnes qui vivent un premier épisode psychotique et celles à risque accru de psychose, afin de leur offrir, ainsi qu'à leurs proches, les services essentiels permettant un engagement actif vers le rétablissement. »
Québec. Ministère de la santé et des services sociaux. Cadre de référence - Programmes d'interventions pour premiers épisodes psychotiques (PIPEP), Gouvernement du Québec [En ligne], 2017, <http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2019/18-914-12W.pdf>
- « Les services d'intervention précoce dans la psychose étaient majoritairement associés avec une réduction des jours d'hospitalisation. »
Aceituno D., Vera N., Prina AM et al. Cost-effectiveness of early intervention in psychosis : Systematic review.*Br J Psychiatry* 2018.
- « Une approche thérapeutique globale, en équipe, des premiers épisodes psychotiques a été associée à une plus grande amélioration de la participation scolaire ou professionnelle, et cet effet semble médié en partie par la participation aux mesures de support à l'emploi et à l'éducation. »
Rosenheck R., Mueser KT, Sint K. et al. Supported employment and education in comprehensive, integrated care for first episode psychosis: Effects on work, school, and disability income.*Schizophr Res.* 2017.